

β-1,3-1,4-葡聚糖酶 (β-1,3-1,4-glucanase) 酶活试剂盒说明书

(货号: BN72110 微板法 96 样)

一、产品简介:

β-1,3-1,4-葡聚糖酶 (又称地衣多糖酶; EC 3.2.1.73) 是一类重要的水解酶, 可以水解谷物中的β-1,3-1,4-葡聚糖, 其在食品、饲料和纺织等领域的具有重要应用价值。

β-1,3-1,4-葡聚糖酶水解底物葡聚糖产生还原性糖。利用 3,5-二硝基水杨酸测定还原糖的量, 在 540nm 读取吸光值, 进而得出β-1,3-1,4-葡聚糖酶的活性大小。

二、试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 120mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂 mg×1 支	4℃保存	使用前甩几下使粉剂落入底部, 再加 1.1mL 蒸馏水, 80℃水浴 10min 充分溶解, 冷却至室温待用。
试剂三	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调试移液器、台式离心机、水浴锅、移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、β-1,3-1,4-葡聚糖酶 (β-1,3-1,4-GA) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品和实验流程, 避免样本和试剂浪费!

1、样本制备:

- ① 组织样本: 取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.5g) 到研钵内, 加入 1mL 提取液, 在冰上进行冰浴匀浆或者液氮研磨。12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 也可以按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例提取。

【注】: 若样本 (如果实样本) 含有高还原糖 (如果糖和葡萄糖), 可参考以下步骤处理样本:

称取约 0.2g 组织 (若水分充足, 需增加样本取样质量的话, 需保证乙醇在整个液体中体积至少 80%), 加入 1mL 经预冷的 95%乙醇冰浴匀浆, 4℃放置 10min; 12000rpm, 4℃离心 5min; 弃上清, 留沉淀, 向沉淀中加入经预冷的 85%乙醇混匀, 4℃放置 10min; 12000rpm, 4℃离心 5min; 弃上清, 留沉淀。再向沉淀中加入 1mL 经预冷提取液, 涡旋混匀, 4℃放置 10min; 12000rpm, 4℃离心 10min; 留上清, 弃沉淀。上清液置冰上待测。

- ② 细菌/真菌样本: 先收集细菌/真菌到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌/真菌加入 1mL 提取液; 冰浴超声波破碎细菌/真菌 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 也可按照细菌或细胞数量 (10⁴ 个): 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

- ③ 液体样本: 若是澄清液体, 直接检测, 若液体样本浑浊, 需 4℃离心后取上清液检测。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 540nm。
- ② 所有试剂解冻至室温 (25℃) 或于水浴锅中孵育 15-30min, 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	50	50
试剂一	140	150
试剂二	10	
混匀后, 37℃孵育 30min		
试剂三	150	150


本产品仅用于科研

TEL: 010-82422342 www.biorigin.Ltd

混匀, 95°C水浴 5min, 取出后用自来水或冰水冷却至室温, 取 200μL 澄清液体于 96 孔板中, 在 540nm 处读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ (每个样本做一个对照管)。

五、结果计算:

1、标准曲线方程: $y = 0.0123x - 0.035$; x 为标准品浓度 (μg), y 为 ΔA 。



2、按蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义为一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot}) = [(\Delta A + 0.035) \div 0.0123] \div (V1 \times Cpr) \div T \times D$$

$$= 54.2 \times (\Delta A + 0.035) \div Cpr \times D$$

3、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织样本每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义为一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.035) \div 0.0123] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D$$

$$= 54.2 \times (\Delta A + 0.035) \div W \times D$$

4、按细菌/真菌数量计算:

酶活定义: 每 1 万个细菌或真菌每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.035) \div 0.0123] \div (500 \times V1 \div V) \div T \times D$$

$$= 0.11 \times (\Delta A + 0.035) \times D$$

5、按液体体积计算:

酶活定义: 每毫升液体中每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mL}) = [(\Delta A + 0.035) \div 0.0123] \div V1 \div T \times D = 54.2 \times (\Delta A + 0.035) \times D$$

V---提取液体积, 1mL;

V1---样本上样体积, 50μL=0.05mL;

T---反应时间, 30min;

W---样本鲜重, g;

500---细菌/真菌总数, 万;

D---稀释倍数, 未稀释即为 1;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品 (1mg/mL): 从标准品管中称量取出 2mg 至一新 EP 管中, 再加 2mL 蒸馏水混匀溶解即 1mg/mL 的葡萄糖 (母液需在两天内用且-20°C保存)。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. mg/mL。
- 3 以上面不同浓度点为横坐标 (x), 对应的 ΔA 标准为纵坐标 (y) 绘制标准曲线, 得到线性回归方程 $y=kx+b$, 将 ΔA 测定带入公式中计算 x (mg/mL)。