

L-Asparagine Content Kit

天冬酰胺(Asn)含量测定试剂盒说明书

货号BN72479 | 方法: 微板法 | 规格: 96 样

一、产品简介:

天冬酰胺 (Asn) 是 20 种天然氨基酸之一, 被所有生物用于蛋白质合成。在人类中是一种非必需氨基酸, 因为它可以在体内由天冬氨酸和谷氨酰胺合成。

本试剂盒利用天冬酰胺酶使天冬酰胺分解成天冬氨酸和 NH_4^+ , 接着在谷氨酸脱氢酶作用下使 NH_4^+ 和 α -酮戊二酸反应, 同时使 NADH 氧化, 通过检测 NADH 在特异吸收波长 340nm 处的下降量, 进而计算出天冬酰胺 (Asn) 的含量。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 100mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	粉体 mg×2 支	-20°C 保存	用前甩几下或离心使粉体落入底部, 分别加 0.55mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后-20°C 保存, 禁止反复冻融, 三天内用完。
试剂二	粉体 mg×1 支	4°C 保存	用前甩几下或离心使粉体落入底部, 再分别加 1.1mL 蒸馏水溶解备用。
试剂三	粉体 mg×1 支	-20°C 保存	
试剂四	液体 15mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂五	液体 μL ×1 支	-20°C 保存	用前甩几下使液体落入底部, 再加 1mL 蒸馏水混匀备用。
标准品	液体 mL×1 支	4°C 保存	此标准品不参与计算, 仅用来验证试剂是否正常。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰、蒸馏水。

四、天冬酰胺(Asn)含量测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本: 0.1g 组织样本 (水分充足的样本建议取 0.5g 左右), 加 1mL 的提取液研磨, 粗提液全部转移到 EP 管中, 12000rpm, 离心 10min, 上清液待测。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4°C 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10^4): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样品: 澄清的液体样本直接检测, 若浑浊则 12000rpm, 离心 10min 取上清液待测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 340nm。

② 所有试剂解冻至室温 (25°C)

③ 在 96 孔板中依次加入:

本产品仅用于科研

TEL: 010-82422342 www.biorigin.Ltd

试剂名称 (μL)	测定管
样本	20
试剂一	10
试剂二	10
试剂三	10
试剂四	140
混匀, 室温 (25°C) 条件下孵育 10min, 于 340nm 处读取 A1。	
试剂五	10
混匀, 室温 (25°C) 条件下孵育 15min, 于 340nm 处读取 A2, $\Delta A = A1 - A2$ 。	

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；
针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、按照样本质量计算：

天冬酰胺(Asn)含量(μmol/g 鲜重)=[$\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^6$] ÷ (W × V1 ÷ V) = 3.22 × $\Delta A \div W$

天冬酰胺(Asn)含量(μg/g 鲜重)=[$\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^6$] ÷ (W × V1 ÷ V) × Mr = 425.4 × $\Delta A \div W$

2、按细胞数量计算：

天冬酰胺(Asn)含量(nmol/10⁴ cell)=[$\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$] ÷ (500 × V1 ÷ V) = 6.43 × ΔA

天冬酰胺(Asn)含量(ng/10⁴ cell)=[$\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$] ÷ (500 × V1 ÷ V) × Mr = 849.5 × ΔA

3、按照液体体积计算：

天冬酰胺(Asn)含量(μmol /mL)=[$\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^6$] ÷ V1 = 3.22 × ΔA

天冬酰胺(Asn)含量(μg/mL)=[$\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^6$] ÷ V1 × Mr = 425.4 × ΔA

V---加入提取液体积，1 mL；

V2---反应体系总体积，2×10⁻⁴ L；

ε---NADH 摩尔消光系数，6.22×10³ L/mol/cm；

500---细胞数量；万；

W---样本质量，g；

V1---样本加样体积，0.02mL；

d---96 孔板光径，0.5cm；

W---样本质量，g；

Mr---天冬酰胺分子量，132.12。