

Soil dehydrogenase (S-DHA) Activity Assay Kit

土壤脱氢酶 (S-DHA) 试剂盒说明书

货号:BN72560 | 方法: 可见分光法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

土壤脱氢酶的活性可以反映土壤体系内活性微生物量以及其对有机物的降解活性, 以评价降解性能。传统方法是用氯化三苯基四氮唑 (TTC) 作为脱氢酶的氢受体, 但生成的有色物质甲臜是不溶于水以至操作麻烦, 且灵敏度低; 本试剂盒提供一种简单, 灵敏, 快速的测定方法, 利用改性的氮四唑盐作为氢受体, 其生成的有色甲臜物质易溶于水, 于 460nm 测定其吸光值, 即得土壤脱氢酶活性。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求
试剂一	液体 3mL×1 瓶	4°C保存
试剂二	液体 40mL×1 瓶	4°C保存

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、筛子、天平、恒温培养箱或水浴锅、低温离心机、蒸馏水。

四、土壤脱氢酶的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备: 取新鲜土样过 40 目筛网, 备用。

2、测定步骤:

① 分光光度计预热 30min, 调节波长到 460 nm, 蒸馏水调零。在 EP 管内依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	空白管
鲜土 (g)	0.1	
试剂一	60	60
试剂二	640	640
剧烈混匀几次, 37°C (水浴锅或恒温培养箱) 避光培养 4h (中间隔段时间晃动几下), 12000rpm 离心 5min, 取全部上清液转移到 1mL 玻璃比色皿中, 460nm 处读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ 。		

注意: 本操作流程适用于绝大多数常规样本检测, 实验条件可根据实际样本状态适度微调; 针对特殊类型样本, 我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算:

酶活单位定义: 在 37°C 时, 每克土壤样品每天催化产生 1μg 甲臜物质为一个酶活性单位。

$$\text{S-DHA}(\mu\text{g/d/g 鲜土}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V1 \times 10^6 \times \text{Mr}) \div W \div T = 84.6 \times \Delta A \div W$$

ϵ ---甲臜物质的摩尔消光系数, $3.1 \times 10^4 \text{ L/mol/cm}$; W---样品质量, g;

V1---反应总体积, $700\mu\text{L} = 0.7 \times 10^{-3} \text{ L}$; d---光径, 1cm; T---培养时间, $4\text{h} = 1/6 \text{ d}$;

Mr---甲臜物质的分子量, 624.47。